

## PROSPECTO

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.**

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no debe darlo a otras personas. Puede perjudicarles, aun cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.

**En este prospecto:**

1. Qué es Postinor 1500 microgramos comprimido y para qué se utiliza
2. Antes de tomar Postinor 1500 microgramos comprimido
3. Cómo tomar Postinor 1500 microgramos comprimido
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Postinor 1500 microgramos comprimido

Postinor 1500 microgramos comprimido

Levonorgestrel

El principio activo es levonorgestrel. Cada comprimido contiene 1500 microgramos. Los demás componentes (excipientes) son: almidón de patata sin gluten, almidón de maíz sin gluten, sílice coloidal anhidra, estearato de magnesio, talco, lactosa monohidrato.

**Titular de la autorización de comercialización:**

Medimpex UK Limited  
127 Shirland Road  
Londres W9 2EP  
Reino Unido

**Responsable de la fabricación:**

Schering AG  
13342 Berlín  
Alemania

**1. QUÉ ES POSTINOR 1500 microgramos comprimido Y PARA QUÉ SE UTILIZA**

Postinor 1500 se presenta en forma de un único comprimido. Cada envase contiene 1 comprimido de forma redonda y color blanco, con la marca “G00” impresa en uno de los lados.

Pertenece al grupo de los anticonceptivos orales.

Postinor 1500 está indicado como anticonceptivo de emergencia dentro de las 72 horas siguientes a haber mantenido relaciones sexuales sin protección o al fallo de un método anticonceptivo.

**POSTINOR 1500 SOLO SE DEBE EMPLEAR COMO MEDIDA DE EMERGENCIA EN LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO.**



## ANTES DE TOMAR POSTINOR 1500 microgramos comprimido

La anticoncepción de emergencia es un método de **uso ocasional**. En ningún caso debe sustituir a un método anticonceptivo convencional.

La anticoncepción de emergencia no evita el embarazo en todos los casos. Si no existe certeza sobre el momento en el que se produjeron las relaciones sexuales sin protección o si dichas relaciones tuvieron lugar hace más de 72 horas en el mismo ciclo menstrual, se debe considerar la posibilidad de embarazo. Si se mantiene una relación sexual durante el tratamiento con Postinor la prevención del embarazo puede no ser eficaz. Deberá realizarse un test de embarazo para descartar un posible embarazo si la menstruación se retrasa más de 5 días o se produce una hemorragia distinta a la habitual en la fecha prevista para la regla por cualquier otro motivo.

Si se produjera un embarazo tras el tratamiento con Postinor se debe considerar la posibilidad de un embarazo ectópico (el óvulo fecundado se implanta fuera del útero). Es probable que el riesgo absoluto de aparición de un embarazo ectópico sea bajo, ya que Postinor 1500 impide la ovulación y la fecundación. El embarazo ectópico puede continuar, a pesar de la aparición de hemorragia uterina.

Por lo tanto, Postinor 1500 no está recomendado en pacientes con riesgo de sufrir un embarazo ectópico (con antecedentes de salpingitis o embarazo ectópico).

### No tome Postinor 1500:

- Si tiene alergia conocida al principio activo levonorgestrel o a cualquiera de los excipientes.

### Tenga especial cuidado con Postinor 1500:

- Si se produce un embarazo tras el tratamiento con Postinor 1500 debido a la posibilidad de un embarazo ectópico.
- Si padece un síndrome grave de malabsorción, como la enfermedad de Crohn, ya que puede disminuir la eficacia de Postinor 1500.
- Si padece una enfermedad grave del hígado, no está recomendado el uso de Postinor 1500.

Postinor 1500 no está recomendado para su uso en niñas, ya que los datos disponibles en adolescentes menores de 16 años son muy limitados.

Tras la ingesta de Postinor 1500 los periodos menstruales suelen ser normales y aparecen en la fecha prevista. En ocasiones puede producirse un adelanto o retraso de algunos días con respecto a la fecha prevista. Acuda a su médico para instaurar o adoptar un método convencional de anticoncepción. Si utiliza de forma habitual un método anticonceptivo hormonal y no aparece la menstruación en el periodo de descanso, tras la administración de Postinor deberá realizarse un test de embarazo para descartar un posible embarazo.

Postinor 1500 no es tan eficaz como un método anticonceptivo convencional y sólo está indicado como medida de emergencia. Si ha demandado tratamiento anticonceptivo de emergencia en reiteradas ocasiones, acuda a su médico para la adopción de un método anticonceptivo convencional.

La administración reiterada de Postinor 1500 dentro de un mismo ciclo menstrual está desaconsejada debido a la posibilidad de alteraciones en el ciclo.



Este medicamento no evita las enfermedades de transmisión sexual, incluido el SIDA.

### **Información importante sobre alguno de los componentes de Postinor 1500:**

Este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

### **Embarazo**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar un medicamento.

Postinor 1500 no debe ser administrado a mujeres embarazadas. Dicho embarazo no se verá interrumpido como consecuencia de su administración.

Si se quedase embarazada a pesar de tomar este medicamento, consulte con su médico.

### **Lactancia**

Levonorgestrel pasa a la leche materna. La exposición del lactante a levonorgestrel puede reducirse si la ingesta del comprimido se realiza inmediatamente después de una toma y se evita la siguiente toma tras la administración de Postinor 1500.

### **Conducción y uso de máquinas**

No se conoce si Postinor 1500 tiene efecto sobre la capacidad de conducción y de manejo de maquinaria.

### **Uso de otros medicamentos:**

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizado o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento incluso los adquiridos sin receta médica.

Si está siguiendo un tratamiento con Postinor 1500 deberá hacérselo saber al médico que vaya a recetarle cualquier otra medicación, para evitar interacciones entre varios medicamentos. Entre ellos están los barbitúricos (incluyendo la primidona), la fenitoína y la carbamazepina (tratamiento de epilepsia); las plantas medicinales con *Hypericum Perforatum* (Hierba de San Juan); la rifampicina y otros antibióticos; ritonavir (un fármaco antiviral); la rifabutina (un antibiótico) y la griseofulvina (un medicamento para el tratamiento de las infecciones por hongos).

Los medicamentos que contienen levonorgestrel pueden aumentar el riesgo de toxicidad de la ciclosporina.

## **3. CÓMO TOMAR POSTINOR 1500 microgramos comprimido**

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras instrucciones distintas.

Recuerde tomar su medicamento.

El tratamiento consiste en la toma de un comprimido de Postinor 1500 por vía oral.



Para obtener la máxima eficacia, debe tomar el comprimido lo antes posible, preferiblemente dentro de las 12 horas, y no más tarde de 72 horas después de haber mantenido relaciones sexuales sin protección. Si el tratamiento con Postinor 1500 es necesario, lo puede tomar en cualquier momento del ciclo menstrual siempre y cuando no se haya producido un retraso de la hemorragia menstrual.

La máxima eficacia se consigue si se toma el comprimido lo antes posible, preferiblemente dentro de las 12 horas, y no más tarde de las 72 horas siguientes a la relación sin protección. Por tanto, no debe retrasar el inicio del tratamiento ya que la eficacia disminuye con el tiempo.

Tras la utilización de la anticoncepción oral de emergencia se recomienda utilizar un método de barrera (preservativo, diafragma o capuchón) hasta el inicio del siguiente ciclo menstrual. La utilización de Postinor 1500 no contraindica la continuación de la anticoncepción hormonal regular.

Si ha usado este medicamento mientras estaba usando anticoncepción oral (píldora anticonceptiva) debe continuar con la toma de los comprimidos del modo habitual.

#### **Como actuar en caso de diarreas y vómitos:**

Si vomita o tiene diarreas antes de transcurridas tres horas desde la toma del comprimido de Postinor o si presenta cualquier alteración del intestino que dificulte la absorción, es posible que la sustancia activa de Postinor 1500 no se haya absorbido por completo. En cualquiera de estas situaciones póngase en contacto con su médico o con el Centro donde le han prescrito este medicamento, ya que deberá tomar otro comprimido inmediatamente.

Si estima que la acción de Postinor 1500 es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

#### **Si toma más Postinor 1500 del que debiera:**

Si se han tomado varios comprimidos a la vez, puede presentar náuseas o hemorragias vaginales.

En caso de sobredosis o ingestión accidental consulte a su médico o al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

#### **4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**

Como todos los medicamentos, Postinor 1500 microgramos comprimido puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

El efecto adverso más comúnmente notificado es náuseas.

Otros efectos adversos notificados tras la administración de Postinor 1500 son:

Trastornos del aparato reproductor y las mamas:

Muy frecuentes (más de 1 persona por cada 10): sangrado no relacionado con menstruación.

Frecuentes (menos de 1 persona por cada 10 pero más de una persona por cada 100): retraso en la menstruación de más de 7 días, hemorragia irregular y manchado, aumento de la sensibilidad en las mamas.

Trastornos del sistema nervioso:



Muy frecuentes (más de 1 persona por cada 10): dolor de cabeza.

Frecuentes (menos de 1 persona por cada 10 pero más de una persona por cada 100): mareos.

Trastornos gastrointestinales:

Muy frecuentes (más de 1 persona por cada 10): dolor en la zona inferior del abdomen, náuseas.

Frecuentes (menos de 1 persona por cada 10 pero más de una persona por cada 100): diarrea, vómitos.

Trastornos generales y del lugar de administración:

Muy frecuentes (más de 1 persona por cada 10): fatiga.

El sangrado menstrual puede alterarse temporalmente, aunque la mayoría de las mujeres presentan la regla en los 7 días alrededor de la fecha esperada.

Si el siguiente periodo menstrual se retrasa más de 5 días, deberá realizarse un test de embarazo para descartar un posible embarazo.

Adicionalmente, en otros estudios se han comunicado los siguientes efectos adversos:

Trastornos de la piel y tejido subcutáneo:

Muy raros (menos de 1 persona por cada 10.000): rash, urticaria, prurito (picor), edema (hinchazón) en la cara.

Si nota efectos adversos no mencionados en este prospecto o si sufre alguno de los efectos adversos descritos de forma grave, comuníquese a su médico o farmacéutico.

## **5. CONSERVACIÓN DE POSTINOR 1500 microgramos comprimido**

Mantener Postinor 1500 fuera del alcance y de la vista de los niños.

Postinor 1500 se debe almacenar en el envase original, con el fin de protegerlo de la luz.

### **Caducidad:**

No utilizar Postinor 1500 después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

**Este prospecto ha sido aprobado en Enero 2006**



## PROSPECTO

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.**

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no debe darlo a otras personas. Puede perjudicarles, aun cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.

**En este prospecto:**

1. Qué es Postinor 1500 microgramos comprimido y para qué se utiliza
2. Antes de tomar Postinor 1500 microgramos comprimido
3. Cómo tomar Postinor 1500 microgramos comprimido
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Postinor 1500 microgramos comprimido

Postinor 1500 microgramos comprimido

Levonorgestrel

El principio activo es levonorgestrel. Cada comprimido contiene 1500 microgramos. Los demás componentes (excipientes) son: almidón de patata sin gluten, almidón de maíz sin gluten, sílice coloidal anhidra, estearato de magnesio, talco, lactosa monohidrato.

**Titular de la autorización de comercialización:**

Medimpex UK Limited  
127 Shirland Road  
Londres W9 2EP  
Reino Unido

**Responsable de la fabricación:**

Schering GmbH und Co. Produktions KG,  
Döbereiner Str. 20,  
99427 Weimar,  
Alemania

**1. QUÉ ES POSTINOR 1500 microgramos comprimido Y PARA QUÉ SE UTILIZA**

Postinor 1500 se presenta en forma de un único comprimido. Cada envase contiene 1 comprimido de forma redonda y color blanco, con la marca "G00" impresa en uno de los lados.

Pertenece al grupo de los anticonceptivos orales.



Postinor 1500 está indicado como anticonceptivo de emergencia dentro de las 72 horas siguientes a haber mantenido relaciones sexuales sin protección o al fallo de un método anticonceptivo.

**POSTINOR 1500 SOLO SE DEBE EMPLEAR COMO MEDIDA DE EMERGENCIA EN LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO.**

## 2. ANTES DE TOMAR POSTINOR 1500 microgramos comprimido

La anticoncepción de emergencia es un método de **uso ocasional**. En ningún caso debe sustituir a un método anticonceptivo convencional.

La anticoncepción de emergencia no evita el embarazo en todos los casos. Si no existe certeza sobre el momento en el que se produjeron las relaciones sexuales sin protección o si dichas relaciones tuvieron lugar hace más de 72 horas en el mismo ciclo menstrual, se debe considerar la posibilidad de embarazo. Si se mantiene una relación sexual durante el tratamiento con Postinor la prevención del embarazo puede no ser eficaz. Deberá realizarse un test de embarazo para descartar un posible embarazo si la menstruación se retrasa más de 5 días o se produce una hemorragia distinta a la habitual en la fecha prevista para la regla por cualquier otro motivo.

Si se produjera un embarazo tras el tratamiento con Postinor se debe considerar la posibilidad de un embarazo ectópico (el óvulo fecundado se implanta fuera del útero). Es probable que el riesgo absoluto de aparición de un embarazo ectópico sea bajo, ya que Postinor 1500 impide la ovulación y la fecundación. El embarazo ectópico puede continuar, a pesar de la aparición de hemorragia uterina.

Por lo tanto, Postinor 1500 no está recomendado en pacientes con riesgo de sufrir un embarazo ectópico (con antecedentes de salpingitis o embarazo ectópico).

### No tome Postinor 1500:

- Si tiene alergia conocida al principio activo levonorgestrel o a cualquiera de los excipientes.

### Tenga especial cuidado con Postinor 1500:

- Si se produce un embarazo tras el tratamiento con Postinor 1500 debido a la posibilidad de un embarazo ectópico.
- Si padece un síndrome grave de malabsorción, como la enfermedad de Crohn, ya que puede disminuir la eficacia de Postinor 1500.
- Si padece una enfermedad grave del hígado, no está recomendado el uso de Postinor 1500.

Postinor 1500 no está recomendado para su uso en niñas, ya que los datos disponibles en adolescentes menores de 16 años son muy limitados.

Tras la ingesta de Postinor 1500 los periodos menstruales suelen ser normales y aparecen en la fecha prevista. En ocasiones puede producirse un adelanto o retraso de algunos días con respecto a la fecha prevista. Acuda a su médico para instaurar o adoptar un método convencional de



anticoncepción. Si utiliza de forma habitual un método anticonceptivo hormonal y no aparece la menstruación en el periodo de descanso, tras la administración de Postinor deberá realizarse un test de embarazo para descartar un posible embarazo.

Postinor 1500 no es tan eficaz como un método anticonceptivo convencional y sólo está indicado como medida de emergencia. Si ha demandado tratamiento anticonceptivo de emergencia en reiteradas ocasiones, acuda a su médico para la adopción de un método anticonceptivo convencional.

La administración reiterada de Postinor 1500 dentro de un mismo ciclo menstrual está desaconsejada debido a la posibilidad de alteraciones en el ciclo.

Este medicamento no evita las enfermedades de transmisión sexual, incluido el SIDA.

### **Información importante sobre alguno de los componentes de Postinor 1500:**

Este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

### **Embarazo**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento.

Postinor 1500 no debe ser administrado a mujeres embarazadas. Dicho embarazo no se verá interrumpido como consecuencia de su administración.

Si se quedase embarazada a pesar de tomar este medicamento, consulte con su médico.

### **Lactancia**

Levonorgestrel pasa a la leche materna. La exposición del lactante a levonorgestrel puede reducirse si la ingesta del comprimido se realiza inmediatamente después de una toma y se evita la lactancia tras la administración de Postinor 1500.

### **Conducción y uso de máquinas**

No se conoce si Postinor 1500 tiene efecto sobre la capacidad de conducción y de manejo de maquinaria.

### **Uso de otros medicamentos:**

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento incluso los adquiridos sin receta médica.

Si está siguiendo un tratamiento con Postinor 1500 deberá hacérselo saber al médico que vaya a recetarle cualquier otra medicación, para evitar interacciones entre varios medicamentos. Entre ellos están los barbitúricos (incluyendo la primidona), la fenitoína y la carbamazepina (tratamiento de epilepsia); las plantas medicinales con *Hypericum Perforatum* (Hierba de San Juan); la rifampicina y otros antibióticos; ritonavir (un fármaco antiviral); la rifabutina (un antibiótico) y la griseofulvina (un medicamento para el tratamiento de las infecciones por hongos).



Los medicamentos que contienen levonorgestrel pueden aumentar el riesgo de toxicidad de la ciclosporina.

### **3. CÓMO TOMAR POSTINOR 1500 microgramos comprimido**

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras instrucciones distintas.

Recuerde tomar su medicamento.

El tratamiento consiste en la toma de un comprimido de Postinor 1500 por vía oral.

Para obtener la máxima eficacia, debe tomar el comprimido lo antes posible, preferiblemente dentro de las 12 horas, y no más tarde de 72 horas después de haber mantenido relaciones sexuales sin protección. Si el tratamiento con Postinor 1500 es necesario, lo puede tomar en cualquier momento del ciclo menstrual siempre y cuando no se haya producido un retraso de la hemorragia menstrual.

La máxima eficacia se consigue si se toma el comprimido lo antes posible, preferiblemente dentro de las 12 horas, y no más tarde de las 72 horas siguientes a la relación sin protección. Por tanto, no debe retrasar el inicio del tratamiento ya que la eficacia disminuye con el tiempo.

Tras la utilización de la anticoncepción oral de emergencia se recomienda utilizar un método de barrera (preservativo, diafragma o capuchón) hasta el inicio del siguiente ciclo menstrual. La utilización de Postinor 1500 no contraindica la continuación de la anticoncepción hormonal regular.

Si ha usado este medicamento mientras estaba tomando anticoncepción oral (píldora anticonceptiva) debe continuar con la toma de comprimidos del modo habitual.

#### **Como actuar en caso de diarreas y vómitos:**

Si vomita o tiene diarreas antes de transcurridas tres horas desde la toma del comprimido de Postinor o si presenta cualquier alteración del intestino que dificulte la absorción, es posible que la sustancia activa de Postinor 1500 no se haya absorbido por completo. En cualquiera de estas situaciones póngase en contacto con su médico o con el Centro donde le han prescrito este medicamento, ya que deberá tomar otro comprimido inmediatamente.

Si estima que la acción de Postinor 1500 es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

#### **Si toma más Postinor 1500 del que debiera:**

Si se han tomado varios comprimidos a la vez, puede presentar náuseas o hemorragias vaginales.

En caso de sobredosis o ingestión accidental consulte a su médico o al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.



#### **4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**

Como todos los medicamentos, Postinor 1500 microgramos comprimido puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

El efecto adverso más comúnmente notificado es náuseas.

Otros efectos adversos notificados tras la administración de Postinor 1500 son:

Trastornos del aparato reproductor y las mamas:

Muy frecuentes (más de 1 persona por cada 10): sangrado no relacionado con menstruación.

Frecuentes (menos de 1 persona por cada 10 pero más de una persona por cada 100): retraso en la menstruación de más de 7 días, hemorragia irregular y manchado, aumento de la sensibilidad en las mamas.

Trastornos del sistema nervioso:

Muy frecuentes (más de 1 persona por cada 10): dolor de cabeza.

Frecuentes (menos de 1 persona por cada 10 pero más de una persona por cada 100): mareos.

Trastornos gastrointestinales:

Muy frecuentes (más de 1 persona por cada 10): dolor en la zona inferior del abdomen, náuseas.

Frecuentes (menos de 1 persona por cada 10 pero más de una persona por cada 100): diarrea, vómitos.

Trastornos generales y del lugar de administración:

Muy frecuentes (más de 1 persona por cada 10): fatiga.

El sangrado menstrual puede alterarse temporalmente, aunque la mayoría de las mujeres presentan la regla en los 7 días alrededor de la fecha esperada.

Si el siguiente periodo menstrual se retrasa más de 5 días, deberá realizarse un test de embarazo para descartar un posible embarazo.

Adicionalmente, en otros estudios se han comunicado las siguientes reacciones adversas:

Trastornos de la piel y tejido subcutáneo:

Muy raros (menos de una persona por cada 10.000): rash, urticaria, prurito (picor), edema (hinchazón) en la cara.

Si nota efectos adversos no mencionados en este prospecto o si sufre alguno de los efectos adversos descritos de forma grave, comuníquese a su médico o farmacéutico.

#### **5. CONSERVACIÓN DE POSTINOR 1500 microgramos comprimido**

Mantener Postinor 1500 fuera del alcance y de la vista de los niños.

Postinor 1500 se debe almacenar en el envase original, con el fin de protegerlo de la luz.

##### **Caducidad:**

No utilizar Postinor 1500 después de la fecha de caducidad indicada en el envase.



Este prospecto ha sido aprobado en Enero 2006

## PROSPECTO

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.**

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no debe darlo a otras personas. Puede perjudicarles, aun cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.

**En este prospecto:**

1. Qué es Postinor 1500 microgramos comprimido y para qué se utiliza
2. Antes de tomar Postinor 1500 microgramos comprimido
3. Cómo tomar Postinor 1500 microgramos comprimido
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Postinor 1500 microgramos comprimido

Postinor 1500 microgramos comprimido

Levonorgestrel

El principio activo es levonorgestrel. Cada comprimido contiene 1500 microgramos. Los demás componentes (excipientes) son: almidón de patata sin gluten, almidón de maíz sin gluten, sílice coloidal anhidra, estearato de magnesio, talco, lactosa monohidrato.

**Titular de la autorización de comercialización:**

MINISTERIO  
DE SANIDAD  
Y CONSUMO  
-----  
Agencia Española de  
Medicamentos y  
Productos Sanitarios



Medimpex UK Limited  
127 Shirland Road  
Londres W9 2EP  
Reino Unido

**Responsable de la fabricación:**

Gedeon Richter LTD  
Gyomroi ut 19-21  
1103 Budapest, Hungría

**1. QUÉ ES POSTINOR 1500 microgramos comprimido Y PARA QUÉ SE UTILIZA**

Postinor 1500 se presenta en forma de un único comprimido. Cada envase contiene 1 comprimido de forma redonda y color blanco, con la marca “G00” impresa en uno de los lados.

Pertenece al grupo de los anticonceptivos orales.

Postinor 1500 está indicado como anticonceptivo de emergencia dentro de las 72 horas siguientes a haber mantenido relaciones sexuales sin protección o al fallo de un método anticonceptivo.

**POSTINOR 1500 SOLO SE DEBE EMPLEAR COMO MEDIDA DE EMERGENCIA EN LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO.**

**2. ANTES DE TOMAR POSTINOR 1500 microgramos comprimido**

La anticoncepción de emergencia es un método de **uso ocasional**. En ningún caso debe sustituir a un método anticonceptivo convencional.

La anticoncepción de emergencia no evita el embarazo en todos los casos. Si no existe certeza sobre el momento en el que se produjeron las relaciones sexuales sin protección o si dichas relaciones tuvieron lugar hace más de 72 horas en el mismo ciclo menstrual, se debe considerar la posibilidad de embarazo. Si se mantiene una relación sexual durante el tratamiento con Postinor la prevención del embarazo puede no ser eficaz. Deberá realizarse un test de embarazo para descartar un posible embarazo si la menstruación se retrasa más de 5 días o se produce una hemorragia distinta a la habitual en la fecha prevista para la regla por cualquier otro motivo.

Si se produjera un embarazo tras el tratamiento con Postinor se debe considerar la posibilidad de un embarazo ectópico (el óvulo fecundado se implanta fuera del útero). Es probable que el riesgo absoluto de aparición de un embarazo ectópico sea bajo, ya que Postinor 1500 impide la ovulación y la fecundación. El embarazo ectópico puede continuar, a pesar de la aparición de hemorragia uterina.

Por lo tanto, Postinor 1500 no está recomendado en pacientes con riesgo de sufrir un embarazo ectópico (con antecedentes de salpingitis o embarazo ectópico).

**No tome Postinor 1500:**

- Si tiene alergia conocida al principio activo levonorgestrel o a cualquiera de los excipientes.

**Tenga especial cuidado con Postinor 1500:**



- Si se produce un embarazo tras el tratamiento con Postinor 1500 debido a la posibilidad de un embarazo ectópico.
- Si padece un síndrome grave de malabsorción, como la enfermedad de Crohn, ya que puede disminuir la eficacia de Postinor 1500.
- Si padece una enfermedad grave del hígado, no está recomendado el uso de Postinor 1500.

Postinor 1500 no está recomendado para su uso en niñas, ya que los datos disponibles en adolescentes menores de 16 años son muy limitados.

Tras la ingesta de Postinor 1500 los periodos menstruales suelen ser normales y aparecen en la fecha prevista. En ocasiones puede producirse un adelanto o retraso de algunos días con respecto a la fecha prevista. Acuda a su médico para instaurar o adoptar un método convencional de anticoncepción. Si utiliza de forma habitual un método anticonceptivo hormonal y no aparece la menstruación en el periodo de descanso, tras la administración de Postinor deberá realizarse un test de embarazo para descartar un posible embarazo.

Postinor 1500 no es tan eficaz como un método anticonceptivo convencional y sólo está indicado como medida de emergencia. Si ha demandado tratamiento anticonceptivo de emergencia en reiteradas ocasiones, acuda a su médico para la adopción de un método anticonceptivo convencional.

La administración reiterada de Postinor 1500 dentro de un mismo ciclo menstrual está desaconsejada debido a la posibilidad de alteraciones en el ciclo.

Este medicamento no evita las enfermedades de transmisión sexual, incluido el SIDA.

### **Información importante sobre alguno de los componentes de Postinor 1500:**

Este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

### **Embarazo**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento.

Postinor 1500 no debe ser administrado a mujeres embarazadas. Dicho embarazo no se verá interrumpido como consecuencia de su administración.

Si se quedase embarazada a pesar de tomar este medicamento, consulte con su médico.

### **Lactancia**

Levonorgestrel pasa a la leche materna. La exposición del lactante a levonorgestrel puede reducirse si la ingesta del comprimido se realiza inmediatamente después de una toma y se evita la lactancia tras la administración de Postinor 1500.

### **Conducción y uso de máquinas**



No se conoce si Postinor 1500 tiene efecto sobre la capacidad de conducción y de manejo de maquinaria.

### **Uso de otros medicamentos:**

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento incluso los adquiridos sin receta médica.

Si está siguiendo un tratamiento con Postinor 1500 deberá hacérselo saber al médico que vaya a recetarle cualquier otra medicación, para evitar interacciones entre varios medicamentos. Entre ellos están los barbitúricos (incluyendo la primidona), la fenitoína y la carbamazepina (tratamiento de epilepsia); las plantas medicinales con *Hypericum Perforatum* (Hierba de San Juan); la rifampicina y otros antibióticos; ritonavir (un fármaco antiviral); la rifabutina (un antibiótico) y la griseofulvina (un medicamento para el tratamiento de las infecciones por hongos).

Los medicamentos que contienen levonorgestrel pueden aumentar el riesgo de toxicidad de la ciclosporina.

### **3. CÓMO TOMAR POSTINOR 1500 microgramos comprimido**

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras instrucciones distintas.

Recuerde tomar su medicamento.

El tratamiento consiste en la toma de un comprimido de Postinor 1500 por vía oral.

Para obtener la máxima eficacia, debe tomar el comprimido lo antes posible, preferiblemente dentro de las 12 horas, y no más tarde de 72 horas después de haber mantenido relaciones sexuales sin protección. Si el tratamiento con Postinor 1500 es necesario, lo puede tomar en cualquier momento del ciclo menstrual siempre y cuando no se haya producido un retraso de la hemorragia menstrual.

La máxima eficacia se consigue si se toma el comprimido lo antes posible, preferiblemente dentro de las 12 horas, y no más tarde de las 72 horas siguientes a la relación sin protección. Por tanto, no debe retrasar el inicio del tratamiento ya que la eficacia disminuye con el tiempo.

Tras la utilización de la anticoncepción oral de emergencia se recomienda utilizar un método de barrera (preservativo, diafragma o capuchón) hasta el inicio del siguiente ciclo menstrual. La utilización de Postinor 1500 no contraindica la continuación de la anticoncepción hormonal regular.

Si ha usado este medicamento mientras estaba usando anticoncepción oral (píldora anticonceptiva) debe continuar con la toma de los comprimidos del modo habitual

### **Como actuar en caso de diarreas y vómitos:**

Si vomita o tiene diarreas antes de transcurridas tres horas desde la toma del comprimido de Postinor o si presenta cualquier alteración del intestino que dificulte la absorción, es posible que la sustancia activa de Postinor 1500 no se haya absorbido por completo. En cualquiera de estas situaciones póngase en contacto con su médico o con el Centro donde le han prescrito este medicamento, ya que deberá tomar otro comprimido inmediatamente.



Si estima que la acción de Postinor 1500 es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

#### **Si toma más Postinor 1500 del que debiera:**

Si se han tomado varios comprimidos a la vez, puede presentar náuseas o hemorragias vaginales.

En caso de sobredosis o ingestión accidental consulte a su médico o al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

#### **4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**

Como todos los medicamentos, Postinor 1500 microgramos comprimido puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

El efecto adverso más comúnmente notificado es náuseas.

Otros efectos adversos notificados tras la administración de Postinor 1500 son:

Trastornos del aparato reproductor y las mamas:

Muy frecuentes (más de 1 persona por cada 10): sangrado no relacionado con menstruación.

Frecuentes (menos de 1 persona por cada 10 pero más de una persona por cada 100): retraso en la menstruación de más de 7 días, hemorragia irregular y manchado, aumento de la sensibilidad en las mamas.

Trastornos del sistema nervioso:

Muy frecuentes (más de una persona por cada 10): dolor de cabeza.

Frecuentes (menos de 1 persona por cada 10 pero más de una persona por cada 100): mareos.

Trastornos gastrointestinales:

Muy frecuentes (más de 1 persona por cada 10): dolor en la zona inferior del abdomen, náuseas.

Frecuentes (menos de 1 persona por cada 10 pero más de una persona por cada 100): diarrea, vómitos.

Trastornos generales y del lugar de administración:

Muy frecuentes (más de una persona por cada 10): fatiga.

El sangrado menstrual puede alterarse temporalmente, aunque la mayoría de las mujeres presentan la regla en los 7 días alrededor de la fecha esperada.

Si el siguiente periodo menstrual se retrasa más de 5 días, deberá realizarse un test de embarazo para descartar un posible embarazo.

Adicionalmente, en otros estudios se han comunicado las siguientes reacciones adversas:

Trastornos de la piel y tejido subcutáneo:

Muy raros (menos de 1 persona por cada 10.000): rash, urticaria, prurito (picor), edema (hinchazón) en la cara.

Si nota efectos adversos no mencionados en este prospecto o si sufre alguno de los efectos



Si se observa cualquier otra reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

#### **5. CONSERVACIÓN DE POSTINOR 1500 microgramos comprimido**

Mantener Postinor 1500 fuera del alcance y de la vista de los niños.

Postinor 1500 se debe almacenar en el envase original, con el fin de protegerlo de la luz.

#### **Caducidad:**

No utilizar Postinor 1500 después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

**Este prospecto ha sido aprobado en Enero 2006**

P-AEM-Postinor 1500-20.12.05

